

Черный аист

Ciconia nigra




Черный аист (*Ciconia nigra*) - крупная околоводная птица. Оперение взрослых особей в основном черное с сильным металлическим блеском, брюхо и часть испода крыльев - белые, клюв и ноги красные. Питание включает рыб, которых аист отлавливает на мелководье, насекомых, лягушек, саламандр.



© Dani Huertas, www.daniscoping.com



© J Hoogenboom, fotonatura.com



Тенденции гнездящихся популяций черного аиста (*Ciconia nigra*) в Европе, 1980 - 2003 годы

Австрия	↗
Албания	?
Армения	→
Азербайджан	↗
Беларусь	↗
Бельгия	↗
Болгария	↗
Босния и Герцеговина	?
БЮР. Македония	↘
Венгрия	↗
Германия	↗
Греция	↗
Дания	↗
Испания	↗
Италия	↗
Латвия	↗
Литва	↗
Люксембург	↗
Молдова	↗
Польша	↗
Португалия	↗
Республика Чехия	↗
Российская Федерация	↗
Румыния	↗
Словакия	↗
Словения	↗
Сербия и Черногория	↗
Турция	↗
Украина	↗
Франция	↗
Хорватия	→
Швеция	↗
Эстония	↗

(BirdLife International, 2004)

Черный аист чаще ведет одинокий образ жизни, встречается в парах и отмечается в стаях во время пролета и на зимовках в местах кормления. Гнездится в низинных увлажненных лесах поблизости от водоемов, ручьев, прудов или по побережьям рек и озер; также гнездится и в гористой местности. Гнезда обычно устраивает на деревьях, реже на выступающих скалах и иногда даже в пещерах. Предпочитает для гнездования места где его не беспокоят человек.

Обычно черный аист ведет себя как мигрирующий вид, хотя некоторые популяции оседлы и проводят зиму в районе своего гнездования. Оседлыми являются часть южноафриканской популяции, определенное число птиц Испании и Португалии. Большая же часть европейской популяции осенью мигрирует в Африку, возвращаясь обратно весной. Популяции из восточной части ареала обычно зимуют в Индии и Центральном Китае.



© G Robbrecht, fotonatura.com



© P. Lorgé, LNVL


Общая численность вида оценивается в 32-44 тысяч особей и повсеместно этот вид немногочисленный. Хотя в Красной книге МСОП 2004 года вид отнесен к группе «вызывающие наименьшие опасения», во многих странах вид считается находящимся под угрозой исчезновения. Несмотря на увеличивающийся ареал вида, его общая численность по-видимому остается стабильной, хотя в отдельных метах отмечается и снижение численности.

Основным фактором, угрожающим черному аисту, является потеря необходимых местообитаний или их деградация, отмечаяющаяся по всему ареалу и связанная с освоением территорий человеком, интенсификацией сельскохозяйственного использования земель и истощением лесов. Воздействие браконьерства и фактор беспокойства также представляют угрозу для этого вида. Много птиц погибает во время пролета из-за столкновения с воздушными электрическими линиями, а также из-за браконьерства.

В большинстве стран по всему ареалу распространения черный аист является объектом охраны согласно национальным законодательствам. Природоохранные мероприятия способствуют сохранению вида; особенно важны при этом меры по охране и реабилитации местообитаний вида, а также проекты, улучшающие менеджмент природных территорий. Существует настоятельная необходимость в более детальной информации о факторах, угрожающих благополучию вида как на местах гнездования, так и на пролетных путях и зимовках.



© Dani Huertas, www.daniscoping.com



ЛЕГЕНДА

- Места зимовок
- Гнездовой ареал
- Осенне пролетные пути
- Места гнездования
- Горы
- Пустыни
- Водоемы
- Водно-болотные угодья
- Лесники

Проекция: Ламберт азимутальная
Широта в центре проекции: 30 00 00



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement
L-2918 Luxembourg

